

INTERVENCIÓN: PROTOCOLOS FESS

FIEBRE
(n = 2
ELEMENTOS)

GLUCOSA
(n = 5
ELEMENTOS)

DEGLUCIÓN
(n = 2
ELEMENTOS)

TOMAS DE TEMPERATURA CADA
4 – 6 h DURANTE 72 HORAS

TEMPERATURA $\geq 37,5$ °C TRATADA CON
PARACETAMOL

GLUCOSA VENOSA
AL INGRESO

PRUEBA DE GLUCEMIA CAPILAR
CADA 1 – 6 h DURANTE 72 HORAS

AL INGRESO: 8-16 mmol/l (NO
DIABÉTICOS, ND) O 8-11 mmol/l
(DIABÉTICOS, D): INFUSIÓN DE SOLUCIÓN
SALINA DURANTE LAS PRIMERAS SEIS
HORAS

GLUCOSA ≥ 16 mmol/l (ND):
INSULINA i.v.



GLUCOSA ≥ 11 mmol/l (D):
INSULINA i.v.

PROGRAMA DE FORMACIÓN Y DE
EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS DEL
PERSONAL DE ENFERMERÍA POR PARTE
DE LOGOPEDAS

PRUEBA DENTRO DE LAS PRIMERAS
24 HORAS EN LA UNIDAD DE ICTUS

DERIVACIÓN AL LOGOPEDA DE LOS
PACIENTES QUE NO SUPERARON LA
PRUEBA PARA UNA EVALUACIÓN
COMPLETA

Escala Cincinnati prehospitalaria en español¹

EXPRESIÓN FACIAL	Haga que el paciente sonría o muestre los dientes	<p>Normal: movimiento simétrico de ambos lados de la cara.</p> <p>Anormal: movimiento asimétrico de ambos lados de la cara o un lado está más bajo.</p> 
MOVIMIENTO DE EXTREMIDADES	Brazos extendidos y ojos cerrados durante 10 segundos	<p>Normal: movimiento simétrico o ausencia de movimiento de ambas extremidades.</p> <p>Anormal: movimiento asimétrico de ambas extremidades, o un brazo cae.</p> 
LENGUAJE	Repetir «Sabe más el diablo por viejo que por diablo»	<p>Normal: pronuncia correctamente las palabras.</p> <p>Anormal: lenguaje confuso, erróneo o ausente.</p>

Si uno de estos tres signos es anormal, la probabilidad de ictus es del 74%¹.

Escala Rankin modificada en español²

0	Asintomático.
1	Puede realizar tareas y actividades habituales, sin limitaciones.
2	Incapacidad para realizar algunas actividades previas, pero pueden valerse por sí mismos, sin necesidad de ayuda.
3	Discapacidad moderada, requieren algo de ayuda pero pueden caminar solos.
4	Discapacidad moderadamente grave; dependientes para actividades básicas de la vida diaria, pero sin necesidad de supervisión continuada .
5	Discapacidad severa; totalmente dependientes. Requieren asistencia continuada.
6	Muerte.

Imágenes obtenidas de: American Heart Association (2011). Advanced Cardiovascular Life Support Provider Manual. USA: First American Heart Association Printing. p. 137. ISBN 9-781616-690106.

²Adaptada de: Aditya Maddali, Farook Abdul Razack, Srihari Cattamanchi, and Trichur V. Ramakrishnan. Validation of the cincinnati prehospital stroke scale. *J Emerg Trauma Shock*. 2018 Apr-Jun; 11(2): 111–114.

³Adaptada de: van Swieten JC, Koudstaal PJ, Visser MC, Schouten HJ, van Gijn J. Interobserver agreement for the assessment of handicap in stroke patients. *Stroke*. 1988 May; 19(5):604-7.