

### Escala NIHSS (National Institute of Health Stroke Scale) validada en español

<b>1a. Nivel de conciencia</b>	Alerta	0
	Somnoliento	1
	Estuporoso	2
	Coma	3
<b>1b. Preguntas LOC</b> ¿En qué mes estamos? ¿Qué edad tiene?	Responde ambas correctamente	0
	Responde una correctamente	1
	Incorrecto	2
<b>1c. Órdenes LOC</b> Abra y cierre los ojos. Apriete y afloje la mano.	Realiza ambas correctamente	0
	Realiza una correctamente	1
	Incorrecto	2
<b>2. Mirada</b>	Normal	0
	Parálisis parcial de la mirada	1
	Desviación oculocefálica	2
<b>3. Campos visuales</b>	Sin déficit campimétricos	0
	Cuadrantanopsia	1
	Hemianopsia homónima	2
	Hemianopsia homónima bilateral, ceguera	3
<b>4. Parálisis facial</b>	Movimientos normales y simétricos	0
	Paresia ligera	1
	Parálisis parcial	2
	Parálisis completa	3
<b>5. Función motora del brazo</b> <b>5a. Brazo izquierdo</b> <b>5b. Brazo derecho</b>	No claudica. BM 5	0
	Claudica. BM 4	1/1
	Algún esfuerzo contra gravedad. BM 3	2/2
	Sin esfuerzo contra gravedad. BM 2-1	3/3
	Ningún movimiento. BM 0	4/4
<b>6. Función motora de la pierna</b> <b>6a. Pierna izquierda</b> <b>6b. Pierna derecha</b>	No claudica. BM 5	0
	Claudica. BM 4	1/1
	Algún esfuerzo contra gravedad. BM 3	2/2
	Sin esfuerzo contra gravedad. BM 2-1	3/3
	Ningún movimiento. BM 0	4/4
<b>7. Ataxia de miembros</b>	Ausente	0
	Presente en una extremidad	1
	Presente en dos extremidades	2
<b>8. Sensibilidad</b>	Normal	0
	Hipoestesia ligera a moderada	1
	Hipoestesia severa o anestesia	2
<b>9. Lenguaje</b>	Normal, sin afasia	0
	Afasia ligera a moderada	1
	Afasia severa. Broca, Wernicke...	2
	Afasia global o mutismo	3
<b>10. Disartria</b>	Articulación normal	0
	Ligera a moderada	1
	Severa o anartria	2
<b>11. Extinción</b>	Sin anormalidad	0
	Parcial (sólo una modalidad afectada)	1
	Completa (más de una modalidad)	2
<b>Total (máximo 42)</b>		

NIHSS = 1: déficit mínimo; NIHSS >1-5: déficit ligero; NIHSS >5-15: déficit moderador; NIHSS >15-20: déficit importante; NIHSS >20: déficit grave.

Escala neurológica Canadiense en español <sup>1</sup>		
Ítem	Estado	Puntuación
<b>Nivel de consciencia</b>	Alerta	3
	Somnolencia	1,5
<b>Orientación</b> Ciudad/hospital/mes/año (puntuá 0 tanto si está desorientado como si no puede hablar)	Orientado/a	1
	Desorientado/a/NA	0
<b>Lenguaje</b> 1ª Comprensión: "cierre los ojos, señale el techo, ¿se hunde una piedra en el agua?" 2ª Expresión: nominar bolígrafo, llave, reloj	Normal	1
	Déficit de expresión	0,5
	Déficit de comprensión	0
OPCIÓN 1: FUNCIÓN MOTORA CON BUENA COMPRESIÓN		
<b>Cara</b> Mostrar los dientes	No parestia	0,5
	Presente parestia	0
<b>Brazo proximal</b> Moderado: no vence resistencia Importante: no vence gravedad	No parestia	1,5
	Moderada	1
	Importante	0,5
	Completa	0
<b>Brazo distal</b> Moderado: no vence resistencia Importante: no vence gravedad	No parestia	1,5
	Moderada	1
	Importante	0,5
	Completa	0
<b>Pierna</b> Moderado: no vence resistencia Importante: no vence gravedad	No parestia	1,5
	Moderada	1
	Importante	0,5
	Completa	0
OPCIÓN 2: FUNCIÓN MOTORA CON DÉFICIT DE COMPRESIÓN		
<b>Cara</b>	Simétrica	0,5
	Asimétrica	0
<b>Brazos</b>	Balance simétrico	1,5
	Balance asimétrico	0
<b>Piernas</b>	Simétrico	1,5
	Asimétrico	0

Mejor puntuación (10) = Menos déficit, exploración normal  
 Menor puntuación (1,5) = Mayor déficit, exploración patología grave  
 Mejor puntuación con déficit de comprensión (pacientes afásicos) = 6,5